ÉPREUVE DE
MATHÉMATIQUES

AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES

CONCOURS D'ENTRÉE
EN PREMIÈRE ANNÉE MPSI

DURÉE 3 H

EXERCICE 1

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue .

Montrer que $F : x \mapsto \int_x^{x+\pi} f(u)\cos(u-x)du$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \int_x^{x+\pi} f(u)\sin(u-x)du - f(x+\pi) - f(x).$$

EXERCICE 2

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que g'' continue.

1. Montrer que $\forall a, x \in \mathbb{R}$

$$\int_a^x (x-t)g''(t)dt = g(x) - g(a) - (x-a)g'(a)$$

Considérons $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\varphi, \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = \int_0^1 f(t)\sin(xt)dt \text{ et } \psi(x) = \int_0^1 tf(t)\cos(xt)dt$$

2. (a) Montrer que $\forall u, v \in \mathbb{R}, |\sin(u) - \sin(v)| \leq |u - v|$.

(b) En déduire que φ est continue sur $\mathbb{R}$.

3. (a) Montrer que $\forall u, v \in \mathbb{R}, |\sin(u) - \sin(v) - (u-v)\cos(v)| \leq \frac{(u-v)^2}{2}$.

(b) En déduire que φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $\varphi' = \psi$.

EXERCICE 3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$.

L'objectif de cet exercice est de trouver deux matrices $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ 0 & x_2 \end{pmatrix}$ telles que $A = PDP^{-1}$.

On pose $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice identité.

Pour une matrice carrée $C = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, les colonnes $C_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \gamma \end{pmatrix}$, $C_2 = \begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix}$ sont appelées respectivement la première et la deuxième colonne de C . Le déterminant de C est le nombre noté $\det(C) = \alpha\delta - \gamma\beta$.

1. Soit x un nombre réel. Déterminer $Q(x) = \det(xI_2 - A)$.

2. Donner x_1, x_2 les racines de $Q(x)$; tels que $x_1 < x_2$.

3. Calculer $X_1 = A - x_1I_2$ et $X_2 = A - x_2I_2$, puis trouver deux matrices colonnes $C_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $C_2 = \begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix}$ non nulles, où α, β, γ et δ sont des entiers naturels, telles que $X_1C_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $X_2C_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

4. On décide alors de former la matrice P à l'aide des deux matrices colonnes C_1 et C_2 , puis de former la matrice diagonale D à l'aide de x_1 et x_2 trouvés précédemment.

(a) Calculer $P^2 - (\alpha + \delta)P$.

(b) En déduire P^{-1} , l'inverse de la matrice P .

(c) Vérifier que $PDP^{-1} = A$.

5. Montrer par récurrence que $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ pour tout entier $n \geq 1$.

6. En déduire une expression de A^n , pour $n \geq 1$.

EXERCICE 4

On considère un entier $n \geq 2$ et un nombre premier p . Pour tout entier $k \geq 0$, on considère les sous-ensembles finis U_k et Ω_k de $\mathbb{N}$ définis par

$$U_k = \{a \in [[1, n]] \text{ tq } p^k \text{ divise } a\}$$

$$\Omega_k = \{a \in [[1, n]] \text{ tq } v_p(a) = k\}$$

où $[[1, n]]$ désigne l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$.

On désigne par $v_p(a) = \max\{k \in \mathbb{N} / p^k \text{ divise } a\}$, en particulier si p ne divise pas a , alors $v_p(a) = 0$.

- Déterminer $m = \sup\{k \in \mathbb{N} / p^k \leq n\}$ en fonction de n et p .
- (a) Montrer que, pour tout $k \in [[0, m]]$, l'ensemble U_{k+1} est strictement inclus dans U_k et que pour $k > m$ on a, $U_k = \emptyset$.
(b) Prouver que les parties $\Omega_0, \dots, \Omega_m$ vérifient : $\forall i, j \in [[0, m]]$ tels que $i \neq j$, $\Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset$ et $\Omega_0 \cup \dots \cup \Omega_m = [[1, n]]$.
- (a) Pour tout $k \geq 0$, établir que $\Omega_k = U_k \setminus U_{k+1}$.
(b) Calculer, pour tout $k \geq 0$, $Card(U_k)$, puis $Card(\Omega_k)$ en fonction de n, p .
- Montrer que $v_p(n!) = \sum_{k=1}^m k \cdot Card(\Omega_k)$ et en déduire la formule de Legendre.

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^m \left[\frac{n}{p^k} \right]$$

où pour tout $k \geq 1$, $\left[\frac{n}{p^k} \right]$ désigne la partie entière de $\frac{n}{p^k}$.

PROBLÈME

Partie 1 :

- Soient $u, v \in \mathbb{R}$ tels que $u < v$.
(a) Montrer que $\exists q \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{q} < v - u$.
(b) En déduire que $\exists r \in \mathbb{Q}$ tel que $u < r < v$. On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- Soit $x \in \mathbb{R}$, Montrer que $\exists (r_n)_n$ une suite de rationnelles telle que : $r_n \rightarrow x$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en 0 et vérifiant $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) + f(y)$.
(a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
(b) Montrer que $\forall r \in \mathbb{Q}, f(r) = r f(1)$.
(c) Conclure que $f(x) = x \cdot f(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue non nulle telle que $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(x+y) = f(x)f(y)$.
(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$.
(b) En posant $g(x) = \ln(f(x))$, montrer que $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que : $f(x) = e^{\lambda x}$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue non nulle telle que $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(x)f(y)$.
(a) Montrer que si f est non nulle, alors $f > 0$.
(b) En considérant la fonction $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = f(\sqrt{x})$ déterminer l'expression de f .
- Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et vérifiant $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(xy) = xf(y) + yf(x)$.
(On pourra commencer par considérer la fonction $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = \frac{f(x)}{x}$).

Partie 2 :

Le but de cette partie est la recherche des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans l'intervalle $[-1, 1]$, vérifiant pour tout réel x la relation $f(2x) = 2(f(x))^2 - 1$, telles que $f(0) = 1$ et que $\frac{1-f(x)}{x^2}$ admette une limite lorsque x tend vers 0, que l'on notera a .

- Justifier que tout x de $[-1, 1]$ s'écrit de façon unique $x = \cos(\theta)$ avec θ dans $[0, \pi]$.
- (a) Vérifier $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\theta)}{\theta^2} = \frac{1}{2}$.
(b) Montrer, pour θ dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, les relations : $\frac{2\theta}{\pi} \leq \sin(\theta)$ et $\cos(\theta) \leq 1 - \frac{\theta^2}{\pi}$.
- Soit f une fonction solution du problème.
On se donne un réel x et l'on pose, pour tout entier naturel n , $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \cos(\theta_n)$, avec θ_n dans $[0, \pi]$.
(a) Montrer que f est continue en 0 et que $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = 0$.
(b) Vérifier l'existence d'un entier N tel que pour $n \geq N$ on ait $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$.
Établir que a est positif et que $f(x) = \cos(x\sqrt{2a})$.